


「健康」を素材から。

フィットファイバー #80


食物繊維、足りてますか？

食物繊維の目標量と摂取量




日本人の年代別食物繊維摂取量 (中央値)

(単位: g/day)



出典: 厚生労働省「日本人の食事摂取基準 (2025 年版)」策定検討会報告書 (案)

▶▶ フィットファイバー #80 でできること




▶▶ 製品概要

項目	フィットファイバー® #80	フィットファイバー® #80P
外観	淡黄色のシラップ 	微黄色の粉末 
固形分	72%以上	93%以上
食物繊維 (酵素-HPLC法)	75%以上 (無水物換算)	
熱量	1 kcal (固形分1gあたり)	
甘味度	砂糖の約10分の1	
表示例	食物繊維, 水溶性食物繊維, 食物繊維 (難消化性グルカン)	

▶▶ 食品中の香り・風味


フィットファイバーは自然な味質を有しています

▶ 食品の味質や風味への影響が小さいです




▶ 食品の香りのマスキングが起こりにくいです

フィットファイバー #80
溶液中: 多分岐構造
香りや風味を閉じ込めにくい



デキストリン
溶液中: 直鎖のラセン構造
香りや風味を閉じ込める



日本食品化工株式会社

特設サイト開設中!



難消化性グルカン を関与成分とする

機能性表示食品 が受理されました！



機能性表示

本品には難消化性グルカン（食物繊維）が含まれます。難消化性グルカン（食物繊維）は、食事の糖の吸収を抑え、食後の血糖値の上昇をおだやかにする機能が報告されています。



機能性表示

本品には難消化性グルカン（食物繊維）が含まれます。難消化性グルカン（食物繊維）は、お通じを改善し、おなかの調子を整える機能が報告されています。



生理機能①


▶ 食後の血糖値コントロール

被験者：20歳以上64歳以下の男女62名(有効解析53名)
被験者基準 ・空腹時血糖値が110～125 mg/dL の者
・負荷食品摂取後30分の血糖値が140～199 mg/dL の者

試験方法



食後血糖値推移






生理機能②

▶ お通じの改善

被験者：20歳以上64歳以下の男女70名(有効解析66名)
被験者基準 排便回数が1週間当たり3～5回の方

試験方法



難消化性グルカンを配合した機能性表示食品の届出の際は
必要なデータのご提供等、当社がサポートします



日本食品化工株式会社

特設サイト開設中！

